

FOVAL CE – 100 ml

EMULGOVATEĽNÝ KONCENTROVANÝ INSEKTICÍD

PROTI LIETAJÚCEMU A LEZÚCEMU HMYZU PRE NEPROFESIONÁLNE DOMÁCE, CIVILNÉ A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

KONCENTROVANÝ PRODUKT, NEPOUŽÍVAŤ NERIEDENÝ!

ÚČINNÉ LÁTKY (V 100G):

cis/trans-cypermetrín (40/60) (8 g), tetrametrín (ISO) (2 g),
piperonyl butoxid (10 g). Obsahuje benzénsulfónovú kyselinu,
C10-13-alkyl deriváty, vápenaté soli.

NEBEZPEČENSTVO

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P201 Pred použitím sa oboznáňte s osobitnými pokynmi.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávať uzamknuté.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu.



POZOR

UFI: 0500-Y01W-F00Q-YFNF

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte v koncentrovanej forme: riaďte sa pokynmi výrobcu. Neprehĺtajte. Nevdychujte pary. Nezamorte týmto prípravkom potraviny, nápoje a nádoby na ne používané. Vyhybajte sa kontaktu s očami. Nezhadzujte prázdne obaly do kanalizačnej siete. Ak sa prípravok použije v dlho obývaných miestnostiach alebo v spálňach, dôkladne ich vyvetrajte predtým, ako budú znovu obývané. Po manipulácii a v prípade kontaktu s pokožkou je potrebné ju okamžite umyť veľkým množstvom vody a mydla. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte obal alebo označenie).

INFORMÁCIE PRE LEKÁROV

Symptómy: blokujú prenos nervových vzruchov hyperstimulujú pre-postsynapticky nervové zakončenia. Zvýšená citlivosť obzvlášť u alergických a astmatických pacientov, ako aj u detí.

Symptómy postihujúce centrálny nervový systém: chvenie, kŕče, porucha hybnosti; dráždenie dýchacích ciest: zvýšený výtok z nosa, kašeľ, bronchospazmus a dýchavičnosť. Pri požití nevyvolávajú zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Je možné ošetrovanie absorpčnými prostriedkami ako napr. aktívnym uhlím. Ak je prehltnuté množstvo veľké, opatrne urobte výplach žalúdka, pričom sa vyhnite odsávaniu a zavedeniu hadičky, ak nie je postihnutý pri vedomí, alebo ak prípravok obsahuje rozpúšťadlá. Terapia: symptomatická a resuscitačná. Obráťte sa na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM a riaďte sa ich pokynmi +421 2 5477 4166.

NEPREDÁVA SA NEZABALENÉ.

PRÁZDNE OBALY NEODHADZUJTE DO VOĽNEJ PRÍRODY

ČAS POTREBNÝ NA BIOCIDNY ÚČINOK: OKAMŽITÝ

Výrobca: KOLLANT S.R.L.

Via Colombo 717 A 30030, Vigonovo (VE) Italy

Distribútor v SR: EKOLAS SK, s.r.o.

Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice

Tel: +421 33 5592096

E-mail: ekolas@ekolas.sk, Web: www.ekolas.sk

Reg.č. : bio/307/D/07/9/CCHLP

Návod na použitie a opis výrobku:

Insekticíd so silným účinkom, najmä ak sa používa na neabsorpčných povrchoch, proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu (mucha, komár, komár tigrový, mravec, ploštica, kliešť). Jeho pôsobenie je silne znížené, ak sa nanáša na savý povrch (strop, vnútorná a vonkajšia stena). Obzvlášť vhodný na dezinfekciu spoločenských priestorov, hotelov, škôl, skladov, priemyselných a vidieckych zariadení a stánkov. Používa sa na boj proti komárom v exteriéri a interiéri a proti muchám v budovách vo vidieckom a poľnohospodárskom prostredí.

Dávkovanie pre 100 ml insekticídu:

Proti lietajúcemu hmyzu: 100 ml/5-10 l vody (koncentrácia 1-2%)

Proti lezúcemu hmyzu: 100 ml/2,5-5l vody (koncentrácia 2-4%)

Obsahuje dávkovacu striekačku**Obdobie použitia celoročne**

Po zriedení vo vode rozprašujte pomocou ručných alebo mechanických rozprašovačov. Proti lezúcemu hmyzu sa odporúča 1 liter roztoku na 10 m² povrchu. Vyhnite sa aplikácii na biele steny.