

# ORES BF-G GRANULE

RODENTICÍDNA NÁVNADA NA OKAMŽITÉ POUŽITIE VO FORME PELIET NA POUŽITIE ŠIROKOU VEREJNOSŤOU  
(TYP VÝROBKU 14)

## BF-G Granule

Rodenticídna návnada na okamžité použitie vo forme peliet (typ výrobku 14)

**Zloženie: 100g produktu obsahuje:**

**Brodifakum (CAS no. 56073-10-0) 0,025g/kg**

**UFI: 9XPV-5UG4-7003-TYTG**

## Výstražné upozornenia:

**H373** Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

## Bezpečnostné upozornenia:

**P102:** Uchovávať mimo dosahu detí.

**P301 +P310 PO POŽITÍ:** Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára.

**P308+P313:** Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

**P501:** Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním dodávateľovi s licenciou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov alebo na zberné miesto, s výnimkou prázdnych čistých obalov, ktoré sa môžu likvidovať ako odpad, ktorý nie je nebezpečný.

**Národné toxikologické informačné centrum, telefón: 00421 2 5477 4166.**

**BIOCÍDNY VÝROBOK (PT14)**

**Číslo autorizácie: SK21-012**

**Držiteľ autorizácie a držiteľ povolenia: KOLLANT S.r.l. – Via C. Colombo, 7/7A - 30030 Vigonovo (VE) - Taliansko**

**Tel.: +39 049 9983000**



**POZOR**

## BF-G GRANULE

RODENTICÍDNA NÁVNADA NA OKAMŽITÉ POUŽITIE VO FORME PELIET NA POUŽITIE ŠIROKOU VEREJNOSŤOU (TYP VÝROBKU 14)  
NA KONTROLU MYŠI DOMOVEJ VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH A POTKANA HNEDEHO VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH A VONKU  
OKOLO BUDOV.

## VLASTNOSTI:

**BF – G GRANULE** je návnada na okamžité použitie na báze antikoagulačných látok vo forme peliet v jednodávkových sáčkoch po 15 g, na hubenie myši domovej (*Mus musculus*) a potkana hnedého (*Rattus norvegicus*) vo všetkých vývojových štádiách (dospelé a mladé jedince), obsahujúca brodifakum. Prípravok neupozorňuje ani nevyvoláva podozrenie u ostatných členov populácie hlodavcov. Obsahuje horkú látku (Denatóniumbenzoát), ktorá pomáha predchádzať konzumácii ľuďmi. Prípravok je možné použiť v budovách a okolo nich, ako sú napríklad domy, pivnice, garáže, sklady atď.

## METÓDA APLIKÁCIE:

Prípravok je pripravený na okamžité použitie vo forme peliet, ktoré sú vopred nadávkované v sáčkoch. Prípravok môže byť použitý iba v riadne označených a originálnych deratizačných staničkách, ktoré prípravok chránia pred poveternosťnými vplyvmi, požitím necieľovými druhmi a uvoľnením do životného prostredia.

**POKYNY NA POUŽÍVANIE:** Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce). Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady. Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblastí, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, peľchy, brlohy atď.). Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi, alebo k iným konštrukciám. Neotvárajte vrecúška s návnadou. Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat. Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

**INŠTRUKCIE NA POUŽITIE:** Kategória používateľov: široká verejnosť.

Spôsob aplikácie: návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Aplikačné dávky a časový rozvrh:

### • Na kontrolu myši domovej (*Mus musculus*) – na použitie vo vnútorných priestoroch:

- **Veľké zamorenie:** 30 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2 m od seba. Čo zodpovedá dvom 15 g vopred nadávkovaným vrecúškam s návnadou pripravenou na použitie.

- **Nízke zamorenie:** 30 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5 m od seba. Čo zodpovedá dvom 15 g vopred nadávkovaným vrecúškam s návnadou pripravenou na použitie.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

• **Na kontrolu potkana hnedého (Rattus norvegicus) – na použitie vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov:** Na každé miesto s návnadou aplikujte 100-200 g návnady BF – G GRANULE, čo predstavuje 7-13 vopred nadávkovaných vrecúšok návnadových peliet pripravených na použitie, každé obsahuje 15 g návnady. Deratizačné staničky umiestnite vo vzdialenosti 5-10 metrov od seba a v každom prípade vo vzdialenosti najmenej 5 m od seba v závislosti od stupňa zamorenia. Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať každých 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, aby sa skontrolovalo, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

V prípade použitia vonku okolo budov: Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

**OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA:** Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Nepoužívajte antikoagulačné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov). Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V prípade domnej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) vyhľadajte poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolajte deratizačnú službu. Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky. Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. **NÁVOD NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI A NÚDZOVÉ OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:** Tento výrobok obsahuje antikoagulačnú látku. Symptómy ktoré môžu nastať pri prehltnutí s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči. **Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.**

V prípade: - dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom - zasiahnutia očí: vypláchnite oči tekutinou na výplach očí, alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút - orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí, nevyvolávajte zvracanie. prehltnutia: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom. Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá. Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „BF - G GRANULE proti hlodavcom“ alebo číslo autorizácie: „SK21-012“, „účinná látka: brodifakum“ a „v prípade nehody volajte Národné toxikologické informačné centrum, telefón: 00421 2 5477 4166“.

**Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu:** Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku:** Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. **Ďalšie informácie:** Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulačné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

#### Distribútor:

EKOLAS SK, s.r.o., Paderovce, Poľná 11 / 2  
919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská Republika  
Tel.: +421 33 5592096, www.ekolas.sk

**Hmotnosť balenia:** 150 g (obsahuje rodenticídnu návnadu – pelety vo vopred pripravených vnútorných obaloch, 10 x 15 g vrecúško)

**Dátum spotreby:** 2 roky od dátumu výroby

