

VOSKOVÉ BLOKY

ZED STRIKE WBF

**Rodenticídna návnada na okamžité použitie vo forme blokov (typ výrobku 14)
na použitie širokou verejnosťou na kontrolu myši domovej (vo vnútorných priestoroch)
a potkany (vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov)**

Obsahuje BRODIFAKUM TECHNICKÝ (CAS číslo 56073–10–0, ES číslo 259-980-5) 0,0017% (=0,017 g/kg)
Číslo autorizácie: SK23-008

Držiteľ autorizácie / Dodávateľ: **ZAPI S.p.A.** - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Taliansko
Tel. +39 049 9597737 - www.zapispa.com - info@zapispa.com

VLASTNOSTI

ZED STRIKE WBF je blokovou návnadou o hmotnosti 20 g (individuálne zabalené), na kontrolu myši domových, potkanov hnedých a potkanov tmavých, vo všetkých fázach ich vývoja. Obsahuje brodifakum, čo je veľmi silná zlúčenina pôsobiaca po jednej dávke a zabezpečujúca kontrolu známych rezistentných populácií hlodavcov.

Vďaka jeho spôsobu pôsobenia dochádza k úmrtiu hlodavcov bez vyvolania podozrenia voči návnade u ostatných členov kolónie.

Formulácia je kombináciou 5 špeciálnych vlastností:

- Netaviaci systém, ktorý obsahuje prítiahľivé látky s malým množstvom vosku a parafínu na zvýšenie rezistencie pri vysokých teplotách.
- Konzervatívny systém, ktorý posilňuje blokovoú rezistenciu proti plesniam a skazeniu a vďaka ktorému je produkt veľmi vhodný na použitie vo vlhkých podmienkach.

- **Systém zmesi troch druhov múky na maximalizáciu chutnosti bloku.**

- **Technológia FLUO-IMP®:** špeciálna prísada, vďaka ktorej je návnada ľahko identifikovateľná aj v slabých svetelných podmienkach a v truse hlodavcov, s jasným žiarením pod UV svetlom. Svietením na trus hlodavcov ručnou UV lampou (čierna svetlo) sa dajú ľahko rozpoznať a sledovať pohyby hlodavcov.

- Včasné nájdenie hrany zľahčujú použitie návnady a predstavujú ideálne riešenie pre prirodzený sklon k ohrozeniu u hlodavcov.

Prostredný otvor na pevné ukotvenie bloku pri deratizačných staniciach umožňuje monitorovanie požitia návnady a znížiť riziko odtiahnutia návnady.

ZED STRIKE WBF sa môže používať vo vnútri alebo okolo vidieckych, civilných a priemyselných budov (vrátane skladov, skladiš, nákladových priestorov lodí), v domoch, pivniciach, garážach, šatníkoch. Jeho použitie je možné aj v energetických rozvodných zariadeniach a v dopravných prostriedkoch.

Výrobok obsahuje horkú látku (*denatónium - benzoát*), ktorá pomáha predchádzať konzumácii ľuďmi.

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

Kategória používateľov: široká verejnosť (neprofesionáli)

Spôsob aplikácie: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staniciach odolných voči manipulácii.

Aplikačné dávky a časový rozvrh:

- Na kontrolu myši domovej (*Mus musculus*) – na použitie vo vnútorných priestoroch:

- 30-50 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každé 2-5 m od seba.

Deratizačné stanície by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné stanície neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

- Na kontrolu potkany (*Rattus norvegicus* a *Rattus rattus*) – na použitie vo vnútorných priestoroch a vonku okolo budov:

- 75-100 g návnady na miesto s návnadou, rozmiestnené každých 5-10 m od seba.

Deratizačné stanície by sa mali kontrolovať len 5 až 7 dní od začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné stanície neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

V prípade použitia vonku okolo budov: Umiestnite deratizačné stanície v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu v deratizačnej stanícke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce). Odstraňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady. Deratizačné stanície by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kmenia, pelechý, brolhy atď.). Keď to je možné, musia byť deratizačné stanície pripravené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Umiestnite deratizačné stanície mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat. Umiestnite deratizačné stanície mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Neumiestňujte deratizačné stanície blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné stanície. Neotváraťte vrecúška s návnadou.

OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Nepoužívajte antikoagulantné rodenticidy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov). Použitie len v deratizačných staniciach odolných voči manipulácii. Označte deratizačné stanície podľa odporúčaní o výrobku. Použitím tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) vyhľadajte poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu. Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné stanície. Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. V prípade použitia vonku okolo budov: Nepoužívajte výrobok blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály).

NÁVOD NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI A NÚDZOVÉ OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNEHO PROSTREDIA

Tento výrobok obsahuje antikoagulačnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

- PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky obráťte sa na TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

- PRI KONTAKTE S OČAMI: Ak sa objavia príznaky opláchnite ich vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a ak je ich odstránenie jednoduché. Obráťte sa na TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

- PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite ústa.

vrecúško: **0-07** / Iepenková škatuľa: **PAP 21**

ORES[®]
BLAVA

Jaslovské Bohunice

VOSKOVÉ BLOKY

ZED STRIKE WBF

Proti potkanom a myšiam



- **Likvidácia celej kolónie**
- **Účinné od prvých požerov**

Obsah: **300 g (15 x 20 g)**



Obrázok slúži len na ilustračné účely.

V prípade výskytu symptómov: Zavolať na linku 112/záchraná zdravotná služba pre lekársku pomoc.

Bez symptómov: Zavolať do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Informácie pre zdravotnícky personál/lekára: V prípade potreby okamžite poskytnite prvú pomoc a potom zavolať do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA.

Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

Deratizačné stanície musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotváraťte“, „obsahuje rodenticid“, „ZED STRIKE WBF - číslo autorizácie SK23-008“, „účinná látka: brodifakum“ a „v prípade nehody volajte Národné toxikologické informačné centrum [telefón: +421 2 54 77 41 66]“.

Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu:

Na konci deratizácie zlikvidujte neskončovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Nevypúšťajte nepoužitý výrobok do pôdy, vodných tokov, kanalizácie (drezu, záchodu...) či do odtokov.

Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku:

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia. Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Výrobok skladujte pri teplotách pod 35°C. Chráňte pred svetlom. Neuchovávajte v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.

Ďalšie informácie: Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulačné rodenticidy účinné 4 až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

Číslo sarže a dátum výroby: viď balenie

Distribútor: **EKOLAS SK, s.r.o.**

Paderovce, Poľná 11/2,

919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská Republika

Tel.: +421 33 5592096

www.ekolas.sk